



- A. adulto en fase marrón y en vuelo
- B. adulto en fase marrón posado en una rama
- C. adulto en fase blanca

# Boba Patirroja

## Red-footed Booby

*Sula sula*

La Boba Patirroja es un ave pelágica que divaga en búsqueda de peces y calamares que captura lanzándose en picada y zambulléndose tras estos. Usa sus alas y patas con membranas para nadar tras sus presas. El plumaje de la bobas patirrojas adultas, tanto de las hembras como de los machos, puede variar. Existen dos fases: una marrón y otra blanca. En la fase marrón, su plumaje es principalmente marrón pero la cola y la rabadilla o espalda baja son blancas. Si están en la fase blanca, su plumaje es mayormente blanco, incluyendo la cola, pero los bordes de las alas son negros. Se pueden observar machos en fase marrón apareándose con hembras en fase blanca y viceversa. Su pico es azulado y la piel alrededor del pico es rosada. Sus patas son rojas. Tiene una bolsa pequeña en la base de la garganta. Las bobas patirrojas llegan a medir 69 a 79 centímetros (27 a 31 pulgadas) y a pesar entre 850 a 1,100 gramos (2 a 2.4 libras).

Anidan en colonias y construyen sus nidos de palitos forrados con hierbas en árboles o arbustos en las Islas de Mona y Monito, en el Cayo Geniquí, Culebra y en la Isla de Desecheo. La población en Isla de Mona se estima entre 1,000 a 2,000 parejas, en Isla de Monito hay unas 200 a 400 parejas, en la Isla Desecheo habitan aproximadamente 150 parejas y en Cayo Geniquí, Culebra, solamente viven unas 4 a 5 parejas. Por su parte, la población en el Caribe insular se estima en un máximo de 10,000 parejas.

